

# Les aérosols doseurs



## Ventolin®

### Actions

Bronchodilatateur à **courte durée d'action**  
**1** seul principe actif

### Technique d'inhalation

- > Retirez le capuchon et agitez l'inhalateur.
- > Tenez l'inhalateur droit avec l'embout buccal vers le bas.
- > Pressez pour libérer une dose (lors de la 1ère utilisation).
- > Expirez profondément par la bouche.  
Ne jamais expirez dans l'appareillage.
- > Mettez l'embout buccal en bouche.
- > Pressez et inspirez rapidement et profondément par la bouche, en même temps.
- > Bloquez la respiration pendant 5 à 10 secondes.
- > Retirez l'embout de la bouche.
- > Expirez lentement par la bouche
- > Essayez l'embout avec un chiffon sec et propre.

### Effets secondaires

Tachycardie, tremblements,  
crampes musculaires, maux de tête.

# Les aérosols doseurs



## Duovent®

### Actions

Bronchodilatateur à **courte durée d'action**  
Association de **2** principes actifs

### Technique d'inhalation

- > Retirez le capuchon et agitez l'inhalateur.
- > Tenez l'inhalateur droit avec l'embout buccal vers le bas.
- > Pressez pour libérer une dose (lors de la 1ère utilisation).
- > Expirez profondément par la bouche.  
Ne jamais expirez dans l'appareillage.
- > Mettez l'embout buccal en bouche.
- > Pressez et inspirez rapidement et profondément par la bouche, en même temps.
- > Bloquez la respiration pendant 5 à 10 secondes.
- > Retirez l'embout de la bouche.
- > Expirez lentement par la bouche
- > Essayez l'embout avec un chiffon sec et propre.
- > Fermez le système.

### Effets secondaires

Tachycardie, tremblements,  
crampes musculaires, maux de tête,  
sécheresse buccale, difficulté d'uriner.

# Les aérosols doseurs



## Ventolin®

### Actions

Bronchodilatateur à **courte durée d'action**  
**1** seul principe actif

### Technique d'inhalation

- > Retirez le capuchon et agitez l'inhalateur.
- > Tenez l'inhalateur droit avec l'embout buccal vers le bas.
- > Pressez pour libérer une dose (lors de la 1ère utilisation).
- > Expirez profondément par la bouche.  
Ne jamais expirez dans l'appareillage.
- > Mettez l'embout buccal en bouche.
- > Pressez et inspirez rapidement et profondément par la bouche, en même temps.
- > Bloquez la respiration pendant 5 à 10 secondes.
- > Retirez l'embout de la bouche.
- > Expirez lentement par la bouche
- > Essuyez l'embout avec un chiffon sec et propre.
- > Fermez le système.

### Effets secondaires

Tachycardie, tremblements,  
crampes musculaires, maux de tête.

# Les aérosols doseurs



## Duorent®

### Actions

Bronchodilatateur à **courte durée d'action**  
Association de **2** principes actifs

### Technique d'inhalation

- > Retirez le capuchon et agitez l'inhalateur.
- > Tenez l'inhalateur droit avec l'embout buccal vers le bas.
- > Pressez pour libérer une dose (lors de la 1ère utilisation).
- > Expirez profondément par la bouche.  
Ne jamais expirez dans l'appareillage.
- > Mettez l'embout buccal en bouche.
- > Pressez et inspirez rapidement et profondément par la bouche, en même temps.
- > Bloquez la respiration pendant 5 à 10 secondes.
- > Retirez l'embout de la bouche.
- > Expirez lentement par la bouche
- > Essuyez l'embout avec un chiffon sec et propre.
- > Fermez le système.

### Effets secondaires

Tachycardie, tremblements,  
crampes musculaires, maux de tête,  
sécheresse buccale, difficulté d'uriner.