

| EXAMEN | DUREE DE L'EXAMEN | CONTRAINTES PARTICULIERES |
|--|---|--|
| Myocarde Adénosine | 1 ^{ère} partie : 30-35' 2 ^{ème} partie : 15' | Stop dérivés café et thé 24h avant l'examen |
| Myocarde repos/effort | 20' | Repas léger. Arrêt des bêtabloquants et des antagonistes calciques, <u>voir cardiologue</u> . Prendre coca et chocolat. Attente de 1 h entre injection et images. |
| Fraction d'éjection | 1 h | Pas à jeun. Ne peut se pratiquer qu'à 48h d'intervalle avec l'étude myocardique au MIBI. |
| Recherche d'amyloïdose cardiaque | 25' | Examen réalisé 3h après injection du traceur. |
| Etude de la fonction rénale | 2h | Pas à jeun. <u>Bien hydraté</u> (10ml/kg de poids corporel) Si test au Captopril stopper les anti-HTA 48h avant. Contacter le service. |
| Etude du parenchyme rénal | 30' | Pas à jeun. Scintigraphie 4 à 6h après injection. Pas de produit de contraste dans les 24-48h |
| Thyroïde Iode 131 | 2h | Suivi oncologique. Arrêt du traitement substitutif pour arriver à une TSH > 30 mU/l. A jeun. Laxatif la veille et le matin de la scintigraphie. Si sous Thyrogen, contacter le service. |
| Lymphoscintigraphie -ganglions sentinelles seins | 15' + 45' | Imagerie à 3 h ou 18h. |
| Mélanome | 15' + 45' | Imagerie à 18h. |
| Lymphoscintigraphie membres inf | 2h | Retrait des bas de contention. |
| Reflux gastro-oesophagien | 1h | A jeun. Prévoir biberon de lait, un yaourt ou jus d'orange. Clichés pulmonaires 4h plus tard si nécessaire. |
| Vidange gastrique | 2h30 | A jeun. Petit déjeuner fourni |
| Meckel Cimétidine co avant l'examen | 1h20 | A jeun. Pas d'examen baryté en radio les 48h précédant la scintigraphie. |
| Sialographie | 1h | Pas à jeun. Prévoir jus de citron. |
| Scintigraphie splénique | 45' | Pas à jeun. |
| Breath test à l'urée | +/- 40' | Non à jeun. Apporter 1 berlingot de jus d'orange ou de pomme. Pas de traitement anti-acide ou pour l'estomac 15 jours à 1 mois avant l'examen. Stop antibiotiques depuis 1 mois. Régime 2 jours avant l'examen : manger uniquement du pain blanc, du riz blanc, des pâtes blanches, pas de céréales complètes ni corn flakes et pas de boisson gazeuse. |
| Breath test trioléine | 6h | A jeun de 12h, apporter 2 tranches de pain blanc, du beurre, du fromage à tartiner gras et 1 bouteille d'eau plate. Stopper Créon 3 jours avant. Régime 2 jours avant l'examen : manger uniquement du pain blanc, du riz blanc, des pâtes blanches, pas de céréales complètes ni corn flakes et pas de boisson gazeuse. Test séquentiel toutes les heures. Prendre occupation. |
| Hémorragies digestives | 90' | Pas de lavement baryté dans les 48 h précédentes. |
| Poumons (ventilation/perfusion) | 60' | Pas à jeun |
| Cerveau HMPAO | 60' | Pas à jeun. <u>40' de préparation</u> . Si possible abstention neuroleptiques. |
| DATSCAN (Parkinson)* | 40' | Contacter le service. Examen 6h après l'injection. Pas le lundi. 1 seul examen remboursable. |
| Squelette | 20' + 45' | Pas à jeun. Examen 3h après injection. Boire abondamment. |
| Recherche d'algodystrophie, os dynamique | 35' + 30' | Injection du traceur sous la caméra, examen 3h plus tard. Pas à jeun. |
| Foyer inflammatoire GA67* | J1 I.V. 10' 50' : J2 J3 | Après injection, prévoir traitement laxatif. Des clichés peuvent être réalisés 6h, 24, 48h et jusqu'à 72h (sarcoïdose, parfois en cas de recherche de sepsis). Souvent couplé à une scintigraphie osseuse. |
| Leucocytes marqués. Scintigraphie au Scintimun | 30 à 60' | Imagerie 1h – 4h et parfois 24h après injection. 1 seul examen réalisable (risque d'HAMA) |
| Thyroïde Tc 99m | 10' | Pas à jeun. Suivant indication, arrêt du traitement hormonal. Voir produit de contraste. |
| Thyroïde Iode 123* | 10' | Pas à jeun. Indispensable pour le calcul de la dose thérapeutique d'iode 131. Eviter iode (RX). Examen 3h après l'injection. |
| Parathyroïde* | 2h30 | Pas à jeun. Investigation d'adénome parathyroïdien. Images à 5' (temps 10') Images à 2h (+/- 30') |
| Surrénales* | 1h | Pas à jeun. Contacter le service. Imagerie à 1h, 24h, 48h. |
| Ostéodensitométrie | 20 à 30' | Impraticable après lavement baryté et transit. Apporter liste de médicaments. |
| Test au sélénium HCAT-75Se | 20' | A jeun. Images à 1h et J7 |

* Traceur à commander, délai de minimum 48h si commande la veille avant 12h.