

L'endoscopie bronchique ou bronchoscopie souple

Déroulement

Durée 15-20 minutes / position semi-assise

- > **En 1^{er} lieu**, l'infirmière d'endoscopie réalise l'anesthésie locale à l'aide d'un spray introduit dans le nez et le fond de la gorge. Ce produit procure une impression désagréable de picotement puis de gonflement dans la gorge et l'impossibilité d'avaler sa salive. Cette sensation est fautive et simplement due à l'anesthésie.
- > **En second lieu**, le médecin réalise l'examen proprement dit. Il introduit soit par le nez ou par la bouche l'endoscope. Il se produit généralement un épisode de toux lors du passage des cordes vocales. Durant l'examen, il vous sera placé une petite pince au bout du doigt pour surveiller votre fréquence cardiaque et la saturation (taux d'oxygène dans le sang) afin d'éviter tout ennui.
- > **Après l'examen**, il vous sera demandé **de rester à jeun pendant 2 H** afin d'éviter d'avaler « de travers » du fait de l'anesthésie locale.

Effets secondaires

La procédure en elle-même est totalement indolore.

La présence de toux et de nausées sont habituelles lors de l'anesthésie locale ce qui occasionne le plus grand désagrément de l'examen.

Si des biopsies sont réalisées, des crachats avec du sang peuvent apparaître dans les heures qui suivent. Il n'est pas rare qu'un pic de température, même jusqu'à 39°C, survienne dans les 12H qui suivent la procédure.

Toutefois, si la fièvre persiste plus de 24H après l'examen, une consultation médicale est nécessaire.

Définition

Examen permettant l'exploration de la trachée et des bronches. Il s'effectue généralement sous anesthésie locale. L'endoscopie est utile pour réaliser des diagnostics et/ou traitements.

L'endoscope employé est constitué d'une poignée de commande et d'un long tuyau souple de moins de 1 cm de diamètre et muni d'une caméra.

But

L'endoscopie permet de visualiser les bronches et d'accomplir en même temps des aspirations, d'introduire des instruments permettant de réaliser des prélèvements de tissu, d'extraire des corps étrangers ou d'effectuer de petites interventions.

Préparation

- > **Etre impérativement à jeun depuis au moins 4H.** Il est fortement recommandé de ne pas fumer dans les 48h avant et dans les heures qui suivent l'examen afin d'éviter le réflexe de toux.
- > Se brosser les dents et/ou procéder à un bain de bouche. Oter les prothèses dentaires avant d'aller à l'examen.
- > **Signaler au médecin si vous prenez des anticoagulants, aspirine et dérivés:** Plavix / Pradaxa / Sintrom / Asaflow / Xarelto /....
- > **Alerter si vous êtes allergique à des médicaments et aux anesthésiques (xylocaïne^R)**
- > Prévenir si vous êtes angoissé par votre examen afin de prévoir un relaxant.

L'endoscopie bronchique ou bronchoscopie souple

Déroulement

Durée 15-20 minutes / position semi-assise

- > **En 1^{er} lieu**, l'infirmière d'endoscopie réalise l'anesthésie locale à l'aide d'un spray introduit dans le nez et le fond de la gorge. Ce produit procure une impression désagréable de picotement puis de gonflement dans la gorge et l'impossibilité d'avaler sa salive. Cette sensation est fautive et simplement due à l'anesthésie.
- > **En second lieu**, le médecin réalise l'examen proprement dit. Il introduit soit par le nez ou par la bouche l'endoscope. Il se produit généralement un épisode de toux lors du passage des cordes vocales. Durant l'examen, il vous sera placé une petite pince au bout du doigt pour surveiller votre fréquence cardiaque et la saturation (taux d'oxygène dans le sang) afin d'éviter tout ennui.
- > **Après l'examen**, il vous sera demandé **de rester à jeun pendant 2 H** afin d'éviter d'avaler « de travers » du fait de l'anesthésie locale.

Effets secondaires

La procédure en elle-même est totalement indolore.

La présence de toux et de nausées sont habituelles lors de l'anesthésie locale ce qui occasionne le plus grand désagrément de l'examen.

Si des biopsies sont réalisées, des crachats avec du sang peuvent apparaître dans les heures qui suivent. Il n'est pas rare qu'un pic de température, même jusqu'à 39°C, survienne dans les 12H qui suivent la procédure.

Toutefois, si la fièvre persiste plus de 24H après l'examen, une consultation médicale est nécessaire.

Définition

Examen permettant l'exploration de la trachée et des bronches. Il s'effectue généralement sous anesthésie locale. L'endoscopie est utile pour réaliser des diagnostics et/ou traitements.

L'endoscope employé est constitué d'une poignée de commande et d'un long tuyau souple de moins de 1 cm de diamètre et muni d'une caméra.

But

L'endoscopie permet de visualiser les bronches et d'accomplir en même temps des aspirations, d'introduire des instruments permettant de réaliser des prélèvements de tissu, d'extraire des corps étrangers ou d'effectuer de petites interventions.

Préparation

- > **Etre impérativement à jeun depuis au moins 4H.** Il est fortement recommandé de ne pas fumer dans les 48h avant et dans les heures qui suivent l'examen afin d'éviter le réflexe de toux.
- > Se brosser les dents et/ou procéder à un bain de bouche. Oter les prothèses dentaires avant d'aller à l'examen.
- > **Signaler au médecin si vous prenez des anticoagulants, aspirine et dérivés:** Plavix / Pradaxa / Sintrom / Asaflo / Xarelto /...
- > **Alerter si vous êtes allergique à des médicaments et aux anesthésiques (xylocaïne^R)**
- > Prévenir si vous êtes angoissé par votre examen afin de prévoir un relaxant.