

Les avantages

Thérapie simple.

Peu de complications.

Durée du traitement : en moyenne 4 semaines (parfois plus si traumatisme important).

La chirurgie reste possible secondairement.

Le pansement toutes les semaines

Les plaies sont rincées avec du liquide physiologique.

Les pourtours des plaies sont essuyés avec une compresse.

La peau saine est dégraissée avec l'éther pour permettre l'adhésion du pansement.

Le pansement (**primaire**) occlusif est apposé sur les plaies et les pourtours de manière à être hermétique.

Un pansement **secondaire** est réalisé : bandage tubulaire ou bandage simple.

Contactez-nous

Vivalia – Hôpital d'Arlon (Clinique Saint-Joseph)

du lundi au vendredi de
8h30 à 16h

Téléphone : 063/23.14.70

Vivalia – Hôpital de Virton (Clinique Edmond Jacques)

du lundi au vendredi de
8h30 à 16h

Téléphone : 063/58.81.20

En dehors de ces horaires, vous rendre aux urgences de l'Hôpital d'Arlon

137 Rue des déportés à
6700 ARLON

*Feuillet réalisé par le service des
consultations de Arlon/Virton*

Spécialité chirurgie de la main

Le pansement occlusif



Dr Pasquazzo

Dr Tsolias



Les indications

Traitement des plaies traumatiques de la ou des dernières phalanges des doigts de la main par l'application d'un pansement occlusif.

Cette thérapie est, dans certains cas, une alternative au traitement chirurgical qui pouvait présenter des complications telles que des nécroses, une infection ou des raideurs au niveau des doigts lésés.

C'est toujours le spécialiste qui vous propose le meilleur traitement adapté à votre traumatisme.

Le principe

Le pansement occlusif est réalisé lors de la consultation et reste en place 7 jours.

L'organisme met en œuvre tous les mécanismes nécessaires à la régénération des tissus ayant été traumatisés.

Les inconvénients et conseils pour y remédier

Odeur particulièrement tenace et parfois désagréable : elle se développe suite à la régénération des tissus.

- Pour dissimuler l'odeur, vous pouvez mettre un bandage supplémentaire (bande Velpeau® par exemple) autour du bandage existant puis verser une goutte d'huile essentielle de votre choix (lavande vraie, menthe poivrée, listée citronnée, orange douce, ...)
> répéter plusieurs fois par jour

Ecoulement en dehors du pansement occlusif (primaire) : il est fréquent la première semaine.

- Appeler le service de consultations qui vous demandera de venir à l'hôpital pour renforcer le pansement primaire > ne pas enlever le pansement !
- Vous pouvez changer le pansement secondaire (bandage) 1 fois sur la semaine.

Complication

Botriomycome (petite tumeur vasculaire bénigne bourgeonnante de couleur rouge vif saignant facilement) qui pourra être aisément traité.

Conseils généraux

Laver la main avec un gant de toilette humide puis essuyer > ne jamais mouiller le bandage (pansement secondaire) et le pansement occlusif (pansement primaire)

Si votre médecin traitant ne connaît pas cette technique, proposez-lui de prendre connaissance de cette brochure et de prendre contact avec l'hôpital s'il a besoin d'informations complémentaires face à votre dossier ou face au traitement instauré par le spécialiste.