

Comment se déroule l'examen ?

Un désinfectant sera appliqué suivi d'une anesthésie locale permettant l'introduction d'une aiguille stérile au niveau thoracique.

L'injection de l'anesthésie peut provoquer une sensation de brûlure ainsi qu'une douleur brève lors du passage de l'aiguille. Le point de ponction sera ensuite recouvert par un pansement.

La durée de l'examen est d'environ 30 à 60 minutes durant lequel vous serez allongé et immobile. Le médecin vous demandera de retenir votre respiration afin de réaliser les prélèvements.

Ensuite celui-ci vous demandera de rester couché du côté ponctionné jusqu'à la réalisation d'une radiographie de contrôle (4h après l'examen) afin de vérifier l'absence de complications. Seulement après cette radio, l'infirmière vous informera si vous pouvez manger et boire.

En général, une nuit d'hospitalisation est prévue avec une radiographie thoracique de contrôle le lendemain.

Quelles sont les complications possibles ?

- > Pneumothorax (décollement du poumon de la paroi thoracique)
- > Hémoptysie (expectoration avec du sang)
- > Dyspnée (difficulté respiratoire) pendant une courte durée

Ponction transthoracique

Qu'est-ce que la ponction transthoracique ?

La ponction (biopsie) transthoracique est un examen qui consiste à introduire une aiguille à travers le thorax en vue de prélever un échantillon de tissus (poumon ou plèvre) qui sera envoyé au laboratoire afin d'y être analysé. Celle-ci se déroule sous contrôle radiologique.

L'examen est réalisé afin de préciser la nature d'une anomalie au niveau du thorax (maladies pulmonaires, cancer, ...).

Que faut-il faire avant la ponction ?

- > A partir de minuit: ne pas boire, ni manger, ni fumer
- > Signaler au médecin et aux infirmières si vous prenez des anticoagulants, aspirine et dérivés (plavix, pradaxa, sintrom, xarelto,...) car ceux-ci devront être arrêtés quelques jours avant l'examen.
- > Signaler si vous avez des allergies à des médicaments et aux anesthésiques (xylocaïne).
- > Prévenir le médecin ou l'infirmière si vous êtes stressé par l'examen afin de prévoir un relaxant.
- > A votre arrivée dans le service, l'infirmière réalisera une anamnèse complète de vos antécédents médicaux et de votre traitement.
- > Un cathéter sera placé ensuite afin d'administrer, si besoin, un antidouleur pendant ou après l'examen.

Ponction transthoracique

Comment se déroule l'examen ?

Un désinfectant sera appliqué suivi d'une anesthésie locale permettant l'introduction d'une aiguille stérile au niveau thoracique.

L'injection de l'anesthésie peut provoquer une sensation de brûlure ainsi qu'une douleur brève lors du passage de l'aiguille. Le point de ponction sera ensuite recouvert par un pansement.

La durée de l'examen est d'environ 30 à 60 minutes durant lequel vous serez allongé et immobile. Le médecin vous demandera de retenir votre respiration afin de réaliser les prélèvements.

Ensuite celui-ci vous demandera de rester couché du côté ponctionné jusqu'à la réalisation d'une radiographie de contrôle (4h après l'examen) afin de vérifier l'absence de complications. Seulement après cette radio, l'infirmière vous informera si vous pouvez manger et boire.

En général, une nuit d'hospitalisation est prévue avec une radiographie thoracique de contrôle le lendemain.

Quelles sont les complications possibles ?

- > Pneumothorax (décollement du poumon de la paroi thoracique)
- > Hémoptysie (expectoration avec du sang)
- > Dyspnée (difficulté respiratoire) pendant une courte durée

Qu'est-ce que la ponction transthoracique ?

La ponction (biopsie) transthoracique est un examen qui consiste à introduire une aiguille à travers le thorax en vue de prélever un échantillon de tissus (poumon ou plèvre) qui sera envoyé au laboratoire afin d'y être analysé. Celle-ci se déroule sous contrôle radiologique.

L'examen est réalisé afin de préciser la nature d'une anomalie au niveau du thorax (maladies pulmonaires, cancer, ...).

Que faut-il faire avant la ponction ?

- > A partir de minuit: ne pas boire, ni manger, ni fumer
- > Signaler au médecin et aux infirmières si vous prenez des anticoagulants, aspirine et dérivés (plavix, pradaxa, sintrom, xarelto,...) car ceux-ci devront être arrêtés quelques jours avant l'examen.
- > Signaler si vous avez des allergies à des médicaments et aux anesthésiques (xylocaïne).
- > Prévenir le médecin ou l'infirmière si vous êtes stressé par l'examen afin de prévoir un relaxant.
- > A votre arrivée dans le service, l'infirmière réalisera une anamnèse complète de vos antécédents médicaux et de votre traitement.
- > Un cathéter sera placé ensuite afin d'administrer, si besoin, un antidouleur pendant ou après l'examen.