


Des drains transtympaniques vont être posés chez votre enfant



Ces drains, appelés aussi aérateurs transtympaniques, ont la forme d'un diabol et seront placés dans la membrane du tympan afin de permettre une bonne aération de l'oreille moyenne


Quelques conseils pour votre retour au domicile.

La **douleur** est quasi inexistante; un peu de paracétamol ou d'ibuprofène à une dose adaptée au poids de votre enfant peut être donnée s'il se plaint de douleur.

Un **saignement par l'oreille**, peut survenir parfois le premier jour.


Tant que les drains sont en place, votre enfant ne peut pas avoir d'eau dans les oreilles.

Avant l'opération, faites réaliser des bouchons d'oreilles personnalisés pour votre enfant. (sur rendez-vous dans les magasins fournissant les appareils auditifs)



Placez-lui ces bouchons lorsqu'il va à la piscine, prend sa douche ou son bain.

Pour la piscine, il existe des bandeaux élastiques de maintien disponibles dans ces mêmes magasins et dans certains magasins de sport.




Une oreille avec un drain peut couler tant que celui-ci est en place. Pas de panique, c'est une petite infection sans danger pour l'audition. Dans ce cas, vous devez rapidement commencer le traitement par gouttes prescrit par votre ORL (le cas échéant, contacter votre médecin traitant)

Après quelques mois (le temps est variable selon les enfants et selon le type d'aérateurs mis en place), les drains quittent le tympan qui se referme en quelques semaines.

A ce moment il ne sera plus nécessaire de mettre les bouchons; c'est votre ORL, lors d'une consultation de contrôle qui vous donnera le feu vert.

Des drains transtympaniques vont être posés chez votre enfant



Ces drains, appelés aussi aérateurs transtympaniques, ont la forme d'un diabol et seront placés dans la membrane du tympan afin de permettre une bonne aération de l'oreille moyenne

Quelques conseils pour votre retour au domicile.

La **douleur** est quasi inexistante; un peu de paracétamol ou d'ibuprofène à une dose adaptée au poids de votre enfant peut être donnée s'il se plaint de douleur.

Un **saignement par l'oreille**, peut survenir parfois le premier jour.


Tant que les drains sont en place, votre enfant ne peut pas avoir d'eau dans les oreilles.

Avant l'opération, faites réaliser des bouchons d'oreilles personnalisés pour votre enfant. (sur rendez-vous dans les magasins fournissant les appareils auditifs)



Placez-lui ces bouchons lorsqu'il va à la piscine, prend sa douche ou son bain.

Pour la piscine, il existe des bandeaux élastiques de maintien disponibles dans ces mêmes magasins et dans certains magasins de sport.



Une oreille avec un drain peut couler tant que celui-ci est en place. Pas de panique, c'est une petite infection sans danger pour l'audition. Dans ce cas, vous devez rapidement commencer le traitement par gouttes prescrit par votre ORL (le cas échéant, contacter votre médecin traitant)

Après quelques mois (le temps est variable selon les enfants et selon le type d'aérateurs mis en place), les drains quittent le tympan qui se referme en quelques semaines.

A ce moment il ne sera plus nécessaire de mettre les bouchons; c'est votre ORL, lors d'une consultation de contrôle qui vous donnera le feu vert.