



Type	Analyses	Conditionnement et transport	TAT
Frottis	Coqueluche Streptocoque B Covid19/Influenza/RSV Chlamydia pneumoniae (Panel respi) Mycoplasme pneumoniae (Panel Respi)	Avec écouvillon dans milieu de transport amies	3 jours
	Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae Mycoplasma genitalium Herpès simplex 1/2 Herpès zoster (VZV)		8 jours
Plasma EDTA (Min 1000µL) < 72heures	Charge virale Hépatite C	Un tube EDTA dédié à l'analyse doit être prélevé. Les tubes EDTA doivent être conservés au frais et parvenir au laboratoire endéans les 72h	3 jours
	Charge virale Hépatite B		8 semaines
	Génotypage Hépatite C		8 jours
Sang total EDTA	CMV EBV Toxoplasme gondii	Les tubes EDTA doivent parvenir au laboratoire dans un délai de temps inférieur à 72 heures	8 jours
	Facteur II prothrombine Facteur V Leiden Hémochromatose Homocystéine (MTHFR) Jak-2		8 jours
	MBCR-ABL (t9-22 majeure, p210)	Remarque importante : pour les t9-22, il est impératif de prélever (au moins) 1 grand tube (10 ml) EDTA	3 jours
	TCRG-IGH BCL1-BCL2 IGK		30 jours
	mBCR-ABL (t9-22 mineure, p190)		3 jours
Moelle osseuse	TCRG-IGH BCL1-BCL2	Le prélèvement conservé au frais doit parvenir au laboratoire dans un délai de temps inférieur à 72 heures	30 jours
			30 jours



Clinique Saint Joseph
Rue des Déportés, 137
Laboratoire
6700 ARLON

**Consignes pour les préleveurs externes - Biologie
moléculaire**

A-SP-BIOM-019

Version : 14

Applicable le : 19-02-2024



	<i>IGK</i>		
--	------------	--	--

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI



	<i>NPM 1</i>		<i>8 jours</i>
Urines	<i>Chlamydia trachomatis</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Mycoplasma genitalium</i> <i>CMV pour BB uniquement</i>	<i>Le prélèvement doit parvenir au laboratoire dans un délai de temps inférieur à 72 heures</i>	<i>8 jours</i>
LCR	<i>Herpès simplex (Panel meningite)</i> <i>Herpès zoster (VZV) (Panel meningite)</i> <i>Entérovirus (Panel meningite)</i>	<i>Le prélèvement doit parvenir au laboratoire dans un délai de temps inférieur à 72 heures</i>	<i>8 jours</i>
	<i>Neisseria meningitidis (Panel meningite)</i> <i>Streptocoque pneumoniae (Panel meningite)</i>		<i>2 jours</i>
Lavage broncho-alvéolaire Aspiration nasale	<i>Chlamydia pneumoniae (Panel respi)</i> <i>Mycoplasme pneumoniae (Panel respi)</i> <i>Covid19/Influenza/RSV</i> <i>BK</i>	<i>Le prélèvement doit parvenir au laboratoire dans un délai de temps inférieur à 72 heures</i>	<i>3 jours</i>
	<i>Herpès simplex 1-2</i> <i>CMV</i>		<i>8 jours</i>
Sperme	<i>Chlamydia trachomatis</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Mycoplasma genitalium</i>	<i>Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans les 72 heures</i>	<i>8 jours</i>
Milieu ThinPrep ou PreservCyt	<i>HPV</i>	<i>Le prélèvement (en solution dans le milieu) doit parvenir au laboratoire endéans 7 jours</i>	<i>15 jours</i>
Selles	<i>Clostridium difficile</i>	<i>Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans les 72 heures</i>	<i>3 jours</i>
4 lames de tissu enrobé dans la paraffine	<i>K-RAS</i> <i>NRAS</i> <i>BRAF</i> <i>EGFR</i>	<i>La pièce est fixée dans le formol (4-10%) durant 14 à 24 h. Les lames doivent parvenir au laboratoire dès que possible</i>	<i>3 jours</i>
	<i>HPV ORL</i>		<i>21 jours</i>
Expecto	<i>BK</i>	<i>Le prélèvement doit parvenir au laboratoire dans un délai</i>	<i>3 jours</i>



		<i>de temps inférieur à 72 heures</i>	
Liquide amniotique	<i>Toxoplasmose CMV</i>	<i>Le prélèvement doit parvenir au laboratoire endéans les 72 heures</i>	<i>8 jours</i>

Le respect de la phase pré-analytique est primordial pour assurer au patient un travail de qualité.

Quand une analyse de biologie moléculaire est demandée, nous insistons fortement pour recevoir des prélèvements destinés uniquement à cet usage. Cette manœuvre permet d'éliminer des risques importants de contamination.

En cas de dosages multiples demandés pour le même type de prélèvement, les analyses de biologie moléculaire sont toujours prioritaires (pour éviter les contaminations).

Les principales non-conformités que nous voulons éviter sont les suivantes :

- Un des prélèvements nécessaire à la réalisation des analyses a été reçu non identifié.
- Non respect du délai de cheminement vers le laboratoire
- Absence de renseignements concernant la date et l'heure du prélèvement (cet élément est important pour garantir le respect du délai depuis le prélèvement)

Veuillez faire parvenir le(s) prélèvement(s) à l'adresse suivante :

Laboratoire des Cliniques Sud-Luxembourg - St Joseph Biologie moléculaire 137, rue des Déportés B-6700 Arlon Belgique Tél : +32 63.55.46.07
--

Pour tous renseignements :



Clinique Saint Joseph
Rue des Déportés, 137
Laboratoire
6700 ARLON

Consignes pour les préleveurs externes - Biologie moléculaire

A-SP-BIOM-019

Version : 14

Applicable le : 19-02-2024



Mr Hougardy

Tél: + 32 63.55.30.90

Mail: Nicolas.Hougardy@vivalia.be

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI