

## Gestion des anticoagulants/antiagrégants : ARRET

<b>Ref. : Reg Anesth Pain Med. 2018 Apr ; 43(3) : 225-262</b>	<b>Risque hémorragique intermédiaire :</b> - Infiltrations cervicales - péridurales, foraminales (et RF) - blocs sympathiques	<b>Risque hémorragique faible :</b> -Blocs nerveux périphériques (yc nerf d'Arnold sous occipital) -Points gachettes, trochanter -ASI et RF ASI -facettes et RF lombaires et thoraciques	<b>Reprise</b>
<b>Aspirine (Asaflow,...)</b>	<b>Oui</b> pour infilt. cervicales : J-6 <b>Non</b> pour procédures lombaires	NON	H+24
<b>AINS</b>	<b>Oui</b> pour infilt. Cervicales : J-4 sauf pour Gambaran et Felden (piroxicam) : J- 10 <b>Non</b> pour procédures lombaires	NON	
<b>Dypiridamole</b>	<b>Oui</b> pour infilt. cervicales : J-2 <b>Non</b> pour procédures lombaires	NON	
<b>Warfarine, Marcoumar</b>	J-5	Selon risque /bénéfice	H+24
<b>Sintrom</b>	J-3	Selon risque /bénéfice	H+24
<b>HBPM prophylactique</b>	H-12	H-12	H+ 4 à 24
<b>HBPM thérapeutique</b>	H-24	H-24	H+4 à 24
<b>Clopidogrel= Plavix</b>	J-7 <b>SAUF</b> Pas d'arrêt si stent cardiaque dans les 12 mois ou infarctus dans les 6 semaines)	NON	H+24
<b>Fondaparinux = Arixtra</b>	J-4	Selon risque /bénéfice	H+24
<b>Prasugrel= Efient</b>	J-10 <b>SAUF</b> idem clopidogrel	NON	H+24
<b>Ticagrelor= Brilique</b>	J-5 <b>SAUF</b> idem clopidogrel	NON	H+24
<b>Debigatran= Pradaxa</b>	J-5 (J-6 si Insuffisance rénale)	Selon risque /bénéfice	H+24/12
<b>Rivaroxaban= Xarelto</b>	J-3	Selon risque /bénéfice	H+24/12
<b>Apixaban= Eliquis</b>	J-5	Selon risque /bénéfice	H+24/12
<b>Tirofiban= Aggrastat</b>	J-1	J-1	H+12

## **Informations patients :**

Si un arrêt du traitement anticoagulant est nécessaire ou si la question balance risque / bénéfice se pose, et que le patient n'a pas d'informations claires: un RDV chez le MT ou en consultation d'algologie doit être prévu (avec son dossier cardio)

**Tableau à remettre à votre médecin traitant si vous prenez des anticoagulants ou antiagrégants, avant de faire une infiltration en algologie.**

Si un relais par HBPM est nécessaire dans les situations à risque d'arrêt de l'anticoagulant/antiagrégant, la dernière injection doit être prévue 24h avant la procédure.

### **Secrétariat de Libramont :**

063/551312 pour les RDV en consultation ou en techniques sous échographie

063/552240 pour les RDV en techniques sous scopie

### **Secrétariat d'Arlon :**

063/551533 pour les RDV en consultations

063/552220 pour les RDV en techniques

### **Secrétariat de Bastogne :**

063/551611 pour les RDV en consultation

063/552240 pour les RDV en techniques